herpy

GECKOR

Rüppell's semaphore gecko

Pristurus flavipunctatus

En liten, dagaktiv gecko från länderna kring södra delen av Röda havet, med en hög, sågtandad svans och gula fläckar. Den blir omkring 8 cm lång inklusive svansen, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln.

Familj: Sphaerodactylidae Tidigare namn: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-8 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**30-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**70-90 dagar** vid 28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Pristurus flavipunctatus*. Skötseln bygger på klimatet i utbredningsområdet och på *Pristurus carteri*, den bäst kända arten i släktet i terrarier.

TEMPERATUR

Skapa en gradient med 28-30 °C i den svala änden och en solplats på 40-45 °C under en spotlampa. På natten får temperaturen sjunka till 20-22 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luften ska vara torr, omkring 30-40 %. Ge en mycket låg skål med friskt vatten, eller lägg stenar i skålen så att djuret inte kan drunkna, och spraya inredningen lätt en gång i veckan så att djuren kan dricka droppar.

LJUS OCH UVB

P. flavipunctatus är dagaktiv och ska ha kraftigt dagsljus och UVB över solplatsen, t.ex. ett T5-rör. Ferguson-zon 3 är en uppskattning för en dagaktiv ökengecko.

UTFODRING

Arten äter små leddjur. Ge hoppstjärtar, bananflugor, små syrsor och andra små insekter, inte bredare än djurets huvud. Mata vuxna djur varannan eller var tredje dag och ungdjur dagligen, och ta bort resterna efter 15-20 minuter.

BETEENDE OCH HANTERING

Pristurus flavipunctatus är snabb och vaksam och lämpar sig inte för hantering, och svansen kan brytas av. Djurens beteende mot varandra i fångenskap är inte dokumenterat.

NATURLIG UTBREDNING

Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia, Sudan, Sydsudan, Egypten och Saudiarabien.