herpy

GECKOR

Ocellated gecko

Sphaerodactylus argus

En liten, dagaktiv dvärggecko från Jamaica och öarna San Andrés och Providencia, bara drygt 6 cm lång med svansen. *Sphaerodactylus argus* är brunaktig med gula prickar och streck på huvudet, lever i torr skog och förna och kan hållas parvis i ett litet, tätt terrarium.

Familj: Sphaerodactylidae Tidigare namn: *Sphaerodactylus argus andresensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6-10 mån.**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**100 dagar** vid 28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Sphaerodactylus argus*, men arten är lätt att hålla och föröka. Den sköts som de besläktade *Sphaerodactylus elegans* och *Sphaerodactylus macrolepis*, dock lite torrare.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 26-28 °C och på natten 20-22 °C. På vintern får dagstemperaturen sjunka till 24 °C och nattemperaturen till 18 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 50-60 %, lägre än för de flesta andra dvärggeckor, eftersom arten lever på torra platser. Det räcker att spraya terrariet varannan dag när det står en liten, låg vattenskål framme.
LJUS OCH UVB	Geckon är dagaktiv. Håll ljuset tänt 12 timmar om dagen vår och sommar och 10 timmar på vintern. Ett lysrör eller en kompaktlysrörslampa i dagsljusfärg räcker och ger samtidigt den värme som behövs.
UTFODRING	Geckon är insektsätare, och allt foder ska vara litet, högst lika stort som djurets huvud. Vuxna tar små syrsor, små gråsuggor, stora bananflugor (*Drosophila hydei*), vaxmott och vaxmottslarver.
BETEENDE OCH HANTERING	Håll arten enskilt eller som ett par. Två hanar får inte sättas ihop, eftersom de slåss.
NATURLIG UTBREDNING	Jamaica och Colombia.