herpy

GECKOR

Barbour's least gecko

Sphaerodactylus torrei

En liten, dagaktiv gecko från sydöstra Kuba med tydlig skillnad mellan könen: hanen har gult huvud och klarorange svans, honan är ljus med mörka tvärband. *Sphaerodactylus torrei* blir bara omkring 8 cm inklusive svans, lägger ett ägg i taget och kräver små foderdjur och ett tätt slutet terrarium.

Familj: Sphaerodactylidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Värmeplats	**31-32 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**80-90 dagar** vid 26-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *Sphaerodactylus torrei* kan hållas i ett terrarium på 60 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd). Ett enskilt djur klarar sig i något mindre. Djuren är revirhävdande, så håll antingen ett djur eller ett par.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 26-28 °C, och ett litet område får under sommarhalvåret nå 31-32 °C. På natten sjunker temperaturen till omkring 24 °C. För en sval vinterperiod kan natten sänkas till omkring 18 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %. Spraya terrariet dagligen så att fuktigheten når 70-80 %, och låt luften torka upp lite mellan sprayningarna. Hälften av botten bör vara lätt fuktig, och resten ska få torka.

LJUS OCH UVB

Sphaerodactylus torrei är dagaktiv, och ett svagt UVB-ljus i Ferguson-zon 1 rekommenderas. Använd ett UVB-rör med låg styrka över ena halvan av terrariet, så att det alltid finns skugga.

UTFODRING

Sphaerodactylus torrei lever av små, levande byten. I naturen är det små syrsor, mott, flugor och skalbaggslarver, och i fångenskap passar små syrsor, bananflugor, små vaxmottslarver och små larver av svart soldatfluga.

BETEENDE OCH HANTERING

Sphaerodactylus torrei är territoriell och aggressiv, så den hålls enstaka eller som ett par med gott om gömslen och plats.

NATURLIG UTBREDNING

Kuba.