herpy

GECKOR

Middle Eastern short-fingered gecko

Stenodactylus doriae

En av de största arterna i släktet *Stenodactylus*: en smal, nattaktiv marklevande gecko med långa ben och fransade tår, som gräver ner sig i sanden på dagen. Det finns bara lite kunskap om skötseln, men arten kan hållas som sina närmaste släktingar i ett torrt sandterrarium.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-8 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**5-11 g**
Livslängd	**9-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Öken**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 20 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**35-38 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**8 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-80 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Stenodactylus doriae*. Upplägget följer de närmaste släktingarna *Stenodactylus petrii* och *Stenodactylus sthenodactylus*, som kommer från samma öknar.

TEMPERATUR
På dagen ska det vara 24-29 °C i terrariet och 35-38 °C på det varmaste stället, till exempel över en värmematta eller en värmeslinga under botten eller under en lampa i ena änden.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luften ska vara låg till måttligt fuktig, omkring 40-60 %. Spraya en del av terrariet lätt på kvällen en eller två gånger i veckan, så att det bildas fuktiga fläckar och vattendroppar, och låt resten vara torrt.

LJUS OCH UVB
Arten är nattaktiv och kan leva utan UVB när den får kalk med D3-vitamin genom fodret. Ett svagt UVB-ljus över en del av terrariet är valfritt, så länge djuren kan gräva ner sig i skugga.

UTFODRING
Grundfodret är levande insekter, mest syrsor, kompletterade med vaxmottlarver, mjölmaskar, minimjölmaskar och flygoförmögna bananflugor. Insekterna får högst vara lika breda som geckons huvud.

BETEENDE OCH HANTERING
Stenodactylus doriae är inte till för hantering. Den är snabb och skör, och svansen kan kastas av. Djuren kommer fram efter mörkrets inbrott och tillbringar dagen i sina gångar. Hanarna kan ge ifrån sig ljud.

NATURLIG UTBREDNING
Saudiarabien, Qatar, Iran, Irak, Israel, Förenade Arabemiraten, Oman, Jordanien och Kuwait.