herpy

GECKOR

Southern spiny-tailed gecko

Strophurus intermedius

Strophurus intermedius är en kraftigt byggd taggsvansgecko från de halvtorra malleebuskagen och skogarna i södra Australien. Ryggen och svansen har två rader orangebruna knölar, och vid fara sprutar den ut en klibbig, illaluktande vätska ur svansen. Den klättrar i buskar och träd, men rör sig också mycket på marken.

Familj: Diplodactylidae Tidigare namn: *Diplodactylus intermedius*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**2-5**
Inkubation	**45-60 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Taggsvansgeckor använder utrymmet väl, så terrariet behöver inte vara stort. Ett par kan hållas i 30 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och en hane med flera honor behöver mer plats.
TEMPERATUR	Använd 25-30 °C på dagen och en solplats på 30-32 °C högt upp på en gren. På natten stängs värmen av, och temperaturen får sjunka till 18-25 °C. Siffrorna är lånade från släktets övriga arter.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara måttlig, omkring 40-60 %, och terrariet ska torka upp helt under dagen. Spraya lätt på grenar och väggar ett par kvällar i veckan, så att djuret kan dricka droppar, och låt bottnen torka emellan.
LJUS OCH UVB	Arten solar sig ibland, så UVB är en fördel, särskilt för ungar och avelshonor.
UTFODRING	I naturen lever *Strophurus intermedius* uteslutande av leddjur: spindlar, skolopendrar, skorpioner, kackerlackor, syrsor, skalbaggar och deras larver. I terrariet passar små syrsor, kackerlackor, mott, flugor och vaxmottslarver.
BETEENDE OCH HANTERING	*Strophurus intermedius* är ett djur att titta på och bör inte hanteras mer än högst nödvändigt. Den kan spruta sin klibbiga, illaluktande vätska, och den kan tappa svansen. Ta aldrig tag i svansen.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.