herpy

GECKOR

## Eastern spiny-tailed gecko

# *Strophurus williamsi*

*Strophurus williamsi* är en liten trädlevande gecko från det torra inlandet i östra Australien. Ryggen och svansen är täckta av gulorange taggar, och när den hotas sprutar den ut en seg, illaluktande vätska ur svansen. Den solar gärna på dagen men jagar mest i skymningen och på natten. Det finns bara få tillförlitliga uppgifter om skötseln av just den här arten, så den passar bäst för erfarna hållare.

Familj: Diplodactylidae  Tidigare namn: *Diplodactylus williamsi*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **10-13 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **4-10 år** |
| Aktiv | **På dagen, i skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Trädlevande** |
| Biotop | **Halvöken och savann** |
| Svårighetsgrad | **Erfaren** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **25-30 °C** |
| Värmeplats | **30-32 °C** |
| Temperatur, natt | **18-25 °C** |
| Luftfuktighet | **40-60 %** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Föda | **Insekter** |
| Hålls | **Ensamma eller parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Kullstorlek | **1-2 ägg** |
| Kullar per år | **2-5** |
| Inkubation | **43-80 dagar**<br>vid 27-30 °C |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga III** |
| EU-bilaga | **Bilaga C** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Strophurus williamsi*, så siffrorna i skötselavsnitten bygger på släktet, särskilt de nära släktingarna *Strophurus ciliaris* och *Strophurus taenicauda*. |
| **TEMPERATUR** | *Strophurus williamsi* är värmekrävande och lever i ett klimat med stor dygnsvariation. Använd en dagstemperatur på 25-30 °C i terrariet och en solplats på omkring 30-32 °C, som geckon kan söka sig till och lämna igen. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN** | För *Strophurus williamsi* ska luftfuktigheten vara måttlig, omkring 40-60 %, och terrariet ska torka upp helt under dagen. |
| **LJUS OCH UVB** | *Strophurus williamsi* solar i naturen, så den har nytta av UVB. |
| **UTFODRING** | I naturen lever *Strophurus williamsi* av leddjur, framför allt syrsor, gräshoppor, nattfjärilar, spindlar och termiter. Ge i fångenskap en varierad blandning av små foderinsekter som syrsor, små kackerlackor och små gräshoppor. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Strophurus williamsi* är mest ett djur att titta på. Den är snabb och nervös och bör inte hanteras mer än absolut nödvändigt. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Australien. |