herpy

GECKOR

Turnip-tailed gecko

Thecadactylus rapicauda

En av Amerikas största geckor: en nattaktiv väntjägare utan rörliga ögonlock, med lodräta pupiller, blå tunga och en svans som växer ut tjock som en rova efter ett förlorat. Arten är utbredd från Mexiko till Brasilien, men är sällsynt i terrarier, och det finns bara få pålitliga uppgifter om skötsel.

Familj: Phyllodactylidae Tidigare namn: *Gekko rapicauda; Gekko laevis; Platydactylus theconyx*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-13 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**16-40 g**
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Värmeplats	**30-31 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**150-200 dagar** vid 24-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett enskilt djur behöver ett terrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (längd × bredd × höjd), och ett par minst 70 × 70 × 90 cm.

TEMPERATUR

Arten är aktiv inom ett relativt snävt temperaturområde. På dagen ska det vara 25-28 °C med en något varmare plats på 30-31 °C högst upp i terrariet, och på natten 21-24 °C. Under omkring 23 °C är djuret inte aktivt.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten behöver hög luftfuktighet. Håll den på 60-80 %: fukten stiger efter en sprayning på kvällen och sjunker under dagen. Låt botten torka lite mellan sprayningarna, så att det inte uppstår mögel.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och gömmer sig i mörka springor på dagen, så UVB är inte nödvändigt när fodret får kalk och D3-vitamin.

UTFODRING

I det vilda är arten en väntjägare med ett mycket brett födoval. Mageninnehåll från vilda djur visar gräshoppor, kackerlackor, skalbaggar, fjärilar, spindlar och skorpioner, och den tar i sällsynta fall också små grodor och ödlor.

BETEENDE OCH HANTERING

Djuret är långsamt och lugnt när det inte är hotat, men kan vara kvickt och aggressivt när det störs. Det kan bita hårt, och svansen kastar det vid ringa tryck.

NATURLIG UTBREDNING

Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Trinidad och Tobago, Aruba, Curaçao, Karibiska Nederländerna, Antigua och Barbuda, S:t Lucia och Grenada.