herpy

GECKOR

Natterer's gecko

Tropiocolotes nattereri

En av världens minsta geckoer, bara 4-6 cm med svans, från kusterna vid Akababukten på Sinai och i sydligaste Israel och Jordanien. Den är nattaktiv och lever på stenig mark. Det finns bara lite kunskap om skötseln, men den sköts som släktets bättre kända arter i ett terrarium på minst 20 × 20 × 20 cm.

Familj: Gekkonidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-6 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Öken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Värmeplats	**35-45 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma, parvis, en hane med flera honor eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tropiocolotes nattereri*.
TEMPERATUR	Håll 26-30 °C på dagen och en liten värmefläck på 35-45 °C i ena änden, mätt på en flat sten under lampan.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luften ska vara torr, omkring 30-50 % och inte över 60 %. Spruta en del av terrariet två till tre gånger i veckan på kvällen eller tidigt på morgonen: djuren slickar dropparna från stenar och gömslen, som de slickar dagg i naturen.
LJUS OCH UVB	*Tropiocolotes nattereri* är nattaktiv, men släktets arter använder gärna värmefläcken, och en fast dygnsrytm är viktig.
UTFODRING	*Tropiocolotes nattereri* lever av mycket små leddjur. Utfodringen följer släktets bättre kända arter: baskosten är mikrosyrsor och vinglösa bananflugor, och som omväxling kan du ge bladlöss, hoppstjärtar och små kackerlacksnymfer.
BETEENDE OCH HANTERING	Beteendet hos *Tropiocolotes nattereri* i fångenskap är inte beskrivet. Släktets hållna arter är små men mycket aktiva, jagar ivrigt på kvällen och är fredliga mot varandra.
NATURLIG UTBREDNING	Egypten, Israel, Jordanien och Saudiarabien.