herpy

GECKOR

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis är en smal, nattaktiv gecko från regnskogarna i nordöstra Queensland. Den har långa, tunna ben, klor på tårna, en kam längs ryggen och en morotsformad svans, och är helt annorlunda byggd än de flesta geckor. Uppfödda djur är härdiga och förökar sig villigt, men arten är fortfarande sällsynt i fångenskap.

Familj: Carphodactylidae Engelska: Chameleon gecko Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**11-13 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 35 × 70 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**75-100 %**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**2 ägg**
Kullar per år	**4-6**
Inkubation	**90-133 dagar** vid 21-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Carphodactylus laevis behöver ett högt terrarium som ger djuren plats att gå ur vägen för varandra. Ett par kan hållas i minst 50 × 35 × 70 cm (längd × bredd × höjd), och mer är bättre om det finns fler djur.

TEMPERATUR

Carphodactylus laevis har låga krav på värme. På dagen ska terrariet hålla 22-28 °C, och på natten sjunker temperaturen 5-6 grader, till omkring 16-22 °C. Det behövs ingen varm plats, och djuren söker sig inte till en svag lampa.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten är avgörande för *Carphodactylus laevis* och ska hela tiden ligga på 75-100 %. Spraya terrariet ordentligt med ljummet vatten dagligen eller minst 2-5 gånger i veckan, oftare i varmt och torrt väder.

LJUS OCH UVB

Carphodactylus laevis är nattaktiv och lever gömd på dagen, så UVB behövs inte. Dagsljus från ett fönster i närheten räcker; annars en svag LED-lampa eller lysrör.

UTFODRING

Carphodactylus laevis är inte kräsen när den väl har vant sig vid fångenskap. Syrsor kan utgöra nästan hela kosten, gärna kompletterade med kackerlackor. Mata 2-3 gånger i veckan.

BETEENDE OCH HANTERING

Carphodactylus laevis är stilla och gömd på dagen och blir aktiv några minuter efter mörkrets inbrott. Den sätter sig då på en gren eller en bit bark och blir ofta sittande i timmar.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.