herpy

GECKOR

Chondrodactylus bibronii

En kraftig, nattaktiv klippgecko från Karoo och de torra trakterna i södra Afrika, med tjocka tår, knottrig hud och mörka tvärband. Den är robust och lätt att hålla, men säljs ofta under fel namn: många djur i handeln är i själva verket den närbesläktade *Chondrodactylus turneri*.

Familj: Gekkonidae Engelska: Bibron's thick-toed gecko Tidigare namn: *Pachydactylus bibronii; Pachydactylus bibroni; Tarentola bibronii*
Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-8 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**19-23 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**2-6**
Inkubation	**45-60 dagar** vid 27-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	För ett vuxet djur eller ett par är 60 × 40 × 40 cm (längd × bredd × höjd) en bra storlek, och större är bättre.
TEMPERATUR	Arten klarar sig med vanlig värme, bara en del av terrariet är varmare än resten. Håll 24-28 °C på dagen med ett varmt hörn på 30-33 °C, och låt temperaturen sjunka till 19-23 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten hör hemma i torra trakter, och terrariet ska vara torrt och luftigt med en luftfuktighet på omkring 30-50 %.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och behöver inte UVB när insekterna pudras med kalk och D3-vitamin, men många djur i fångenskap solar sig gärna under ett svagt ljus.
UTFODRING	Geckon är insektsätare och tar nästan allt den kan övermanna. Syrsor och mjölmask är det klassiska grundfodret, kompletterat med gräshoppor, dubiakackerlackor och någon enstaka gång vaxmasklarver.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är territoriell, och vuxna hanar slåss, ofta så att de förlorar tår eller bitar av huden. Hanar får därför aldrig hållas tillsammans. En hane kan hållas med två-tre honor om terrariet är stort och har många gömställen.
NATURLIG UTBREDNING	Sydafrika, Namibia och Botswana.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/chondrodactylus-bibronii