herpy

GECKOR

Coleonyx elegans

En smal, nattaktiv marklevande gecko från skogarna i södra Mexiko, Guatemala och Belize, med svarta, kantiga band på beige grund och rörliga ögonlock. Den är släkt med *Eublepharis macularius*, men mindre och spinkigare, lever av små insekter och vill ha det ljumt med ett fuktigt gömställe.

Familj: Eublepharidae Engelska: Yucatan banded gecko Tidigare namn: *Coleonyx coleonyx; Gymnodactylus scapularis* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-18 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**50-60 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**11-12 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**40-60 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 45 × 30 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Bottenytan betyder mycket mer än höjden, för arten lever på marken.
TEMPERATUR	Håll 24-28 °C på dagen och 20-23 °C på natten, med ett varmt område på 29-32 °C i ena änden, så att djuret själv kan välja.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Håll luftfuktigheten på 50-60 % och skapa i stället ett fuktigt mikroklimat i gömstället och i en del av botten.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och behöver inget särskilt ljus. Ett tidsstyrt ljus i 10-12 timmar eller dagsljus från rummet ger en fast dygnsrytm. På natten ska det vara mörkt.
UTFODRING	Geckon lever av insekter och andra små ryggradslösa djur. Dubiakackerlackor eller syrsor lämpar sig som grundfoder, och små mjölmaskar, soldatflugelarver och vaxmasklarver ger omväxling.
BETEENDE OCH HANTERING	Geckon är skygg och aktiv på natten. Vildfångade djur är ofta nervösa och kastar lätt svansen, medan uppfödda djur kan vänja sig vid hållaren och med tiden tåla försiktig hantering.
NATURLIG UTBREDNING	Mexiko, Guatemala och Belize.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/coleonyx-elegans