herpy

GECKOR

Cyrtodactylus peguensis

En nattaktiv gecko från Myanmar, Thailand och Västmalaysia, känd från skogarna vid Pegu. Det finns bara få tillförlitliga skötseluppgifter om arten, så vägledningen bygger på erfarenheter av andra arter i släktet och är en försiktig utgångspunkt.

Familj: Gekkonidae Engelska: Pegu bent-toed gecko Tidigare namn: *Gymnodactylus peguensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**90-150 dagar** vid 22-25 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Uppgifterna här är lånade från besläktade arter i släktet *Cyrtodactylus* och från de allmänna kraven för nattaktiva, klättrande geckor från fuktiga trakter, inte från *C. peguensis* själv.
TEMPERATUR	Det finns inga dokumenterade temperaturer för *Cyrtodactylus peguensis*.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten är sannolikt beroende av hög luftfuktighet, men siffrorna är lånade från släktingar. *C. irianjayaensis* hålls vid 70-100 % och *C. elok* vid 70-85 %.
LJUS OCH UVB	Det finns ingen dokumenterad kunskap om hur mycket ljus *Cyrtodactylus peguensis* kräver. Arten är nattaktiv, och besläktade arter klarar sig med svag belysning.
UTFODRING	Arten är insektsätare. Uppgifterna om foder är lånade från släktingar och är inte dokumenterade för *Cyrtodactylus peguensis*. Ge syrsor, dubiakackerlackor och liknande insekter som är mindre än avståndet mellan djurets ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	Släktet har rykte om sig att vara skyggt, snabbt och ha tunn, känslig hud som lätt spricker. Grips den kan den bita. Hantering avråds därför, och ett djur ska alltid få tid att vänja sig efter en flytt.
NATURLIG UTBREDNING	Myanmar (Burma), Thailand och Malaysia.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/cyrtodactylus-peguensis