herpy

GECKOR

Eurydactylodes symmetricus

Eurydactylodes symmetricus är en liten, nattaktiv och sällsynt gecko från snår och skog i södra Nya Kaledonien, med stora, symmetriskt ordnade huvudfjäll och en gripsvans. Den är långt mindre känd än släktingarna *Eurydactylodes agricolae* och *Eurydactylodes vieillardi*, men skötseln är förmodligen nästan likadan.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Symmetrical gecko Tidigare namn: *Eurydactylus symmetricus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**10-13 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**50-90 dagar** vid 22-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Eurydactylodes symmetricus*. Siffrorna här är lånade från *Eurydactylodes vieillardi* och *Eurydactylodes agricolae*, som har samma storlek och levnadssätt.
TEMPERATUR	Ge en varm plats under en lampa på 27-29 °C och en sval zon på 21-24 °C. På dagen ligger temperaturen i större delen av terrariet på 22-26 °C, och på natten sjunker den till 20-23 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Håll luftfuktigheten på 60-80 %, mätt mitt i terrariet. Den ska stiga på natten och sjunka under dagen, men aldrig komma under 50 %.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och klarar sig utan UVB när fodret innehåller D3-vitamin, men svagt UVB-ljus är en fördel.
UTFODRING	Arten är förmodligen frukt- och insektsätande som släktets övriga arter. Ge ungefär hälften färdigfoder för fruktätande geckor, rört till en tjock gröt i en skål på en väggmonterad hylla, och hälften levande insekter.
BETEENDE OCH HANTERING	Släktets arter är små, relativt lugna och kan vänjas vid hantering. Låt ett nytt djur få två veckors ro och hantera det bara om det har ätit.
NATURLIG UTBREDNING	Nya Kaledonien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/eurydactylodes-symmetricus