herpy

GECKOR

Goniurosaurus araneus

En spenslig, långbent tigergecko från karstbergen på gränsen mellan norra Vietnam och södra Kina, med fyra breda orange band på rostbrun grund. Artnamnet *araneus* kommer av latinets ord för spindel. Geckon trivs vid rumstemperatur och hög luftfuktighet och är hotad i naturen, så den kräver både papper och en skötare med erfarenhet.

Familj: Eublepharidae Engelska: Vietnamese leopard gecko Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19-22 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**45-80 dagar** vid 24-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 60 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och ett par eller en trio med en hane och två honor behöver ungefär 90 cm i längd.

TEMPERATUR
Arten är en sval gecko som sällan behöver extra värme i ett danskt vardagsrum. På dagen passar 22-26 °C, och på natten får temperaturen sjunka till 19-22 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten ska ligga på 60-90 %: högst på natten efter besprutning och något lägre på dagen. På dagen kan den sjunka till omkring 50 %, när kvällens besprutning höjer den till 90 % igen.

LJUS OCH UVB
Arten är aktiv i skymningen och på natten och sitter gömd under dagen, så den använder inte ljuset för att värma sig. En fast dygnsrytm räcker, till exempel T5-rör 11,5-12 timmar om dagen på sommaren och 8-10,5 timmar på vintern.

UTFODRING
Arten är insektsätare och tar nästan allt som är tillräckligt litet. Ge syrsor, dubia-kackerlackor, gräshoppor och silkesmask, och variera gärna mellan flera slag. Bytet får inte vara större än avståndet mellan djurets ögon.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten är skygg och snabb och försvinner i gömställen när den blir skrämd. Den lämpar sig inte för hantering, så ta bara upp den när substratet byts eller när den ska vägas. Ge nya djur minst två veckors ro.

NATURLIG UTBREDNING
Vietnam och Kina.