herpy

GECKOR

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus är en robust, nattaktiv gecko från Syd- och Sydostasien, som har följt med fartyg och last ut över hela tropikerna och i dag bor i husen i stora delar av världen. Den klättrar på lodräta ytor, jagar insekter under lampor och ropar med ett högt, tickande kluckande. I terrarier är den sällsynt, och den är mest känd som en invasiv art.

Familj: Gekkonidae Engelska: Common house gecko Tidigare namn: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och klipplevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**6-12 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**46-62 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Hemidactylus frenatus är sällan beskriven i fångenskap, så rekommendationerna här är en bedömning utifrån dess levnadssätt och från andra små, klättrande geckor.

TEMPERATUR
Det finns inga bra, offentligt tillgängliga temperatursiffror från fångenskap, så siffrorna här bygger på artens levnadssätt och på att den själv reglerar sin kroppstemperatur vid 26-35 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Håll en luftfuktighet på omkring 50-70 %, och spraya terrariet lätt en gång om dagen, helst på kvällen, så att det finns dagg på blad och stenar. Fuktigheten ska kunna sjunka under dagen.

LJUS OCH UVB
Hemidactylus frenatus är aktiv i skymningen och på natten, och det finns ingen dokumenterad UVB-rekommendation.

UTFODRING
I naturen är *Hemidactylus frenatus* en mångsidig jägare. Insekter och spindlar utgör större delen av kosten: kackerlackor, termiter, flugor, nattfjärilar, skalbaggar, bin och getingar.

BETEENDE OCH HANTERING
Hemidactylus frenatus är snabb, nervös och ska inte hanteras. Den kan bita om den är stressad, men bettet är ganska svagt och ofarligt för människor.

NATURLIG UTBREDNING
Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien och Filippinerna.