herpy

GECKOR

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis är en liten, gråbrun dvärggecko från södra och östra Afrika, där den lever på träd i savann och öppen skog och ofta på husväggar. Den är dagaktiv, blir 7-9 cm inklusive svans och väger under 1 g. Arten är släktets typart och vanlig i naturen, men hålls sällan.

Familj: Gekkonidae Engelska: Common dwarf gecko Tidigare namn: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-9 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**0,7-1,1 g**
Livslängd	**4-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-75 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9-15 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-120 dagar** vid 24-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Lygodactylus capensis*. Klimatet i utbredningsområdet är varmt med regn på sommaren och en torr, svalare vinter, och arten lever på träd i savann och öppen skog.

TEMPERATUR

På dagen ska bakgrundstemperaturen ligga på 25-30 °C med en solplats på 30-35 °C under en liten spotlampa.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten hålls på 50-60 % på dagen och 60-75 % på natten. Spraya lätt varje morgon så att blad och väggar får droppar, och låt terrariet torka upp under dagen.

LJUS OCH UVB

Lygodactylus capensis sitter ofta i full sol och behöver kraftigt, jämnt ljus. Använd T5-lysrör eller LED med dagsljus, och kombinera med ett UVB-rör. UVB-styrkan är inte dokumenterad för arten.

UTFODRING

Myror utgör 30-50 % av födan i naturen. I terrariet består kosten av små levande foderdjur: små syrsor, bananflugor, hoppstjärtar, bönvivlar, små gråsuggor och små kackerlackor.

BETEENDE OCH HANTERING

Lygodactylus capensis är snabb och kan lätt komma undan eller skadas, och svansen kastas lätt, så arten lämpar sig inte för hantering. Öppna bara dörrarna kortvarigt, och håll ögonen på springor där djuren kan komma ut.

NATURLIG UTBREDNING

Sydafrika, Eswatini, Moçambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Malawi, Kongo-Kinshasa, Tanzania och Kenya.