herpy

GECKOR

Lygodactylus fischeri

Lygodactylus fischeri är en liten, dagaktiv dvärggecko från regnskogarna i Väst- och Centralafrika. Den är ljust olivgrön med rader av små svarta prickar, lever dolt på träd i fuktig skog och är nästan okänd i terrarier, så vägledningen bygger på livsmiljön och på besläktade arter.

Familj: Gekkonidae Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-120 dagar** vid 22-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Lygodactylus fischeri*.
TEMPERATUR	*Lygodactylus fischeri* kommer från ett varmt klimat utan kall årstid. På dagen ska bakgrundstemperaturen ligga på 25-30 °C, och under en liten spotlampa eller halogenlampa ska det finnas en solplats på 30-35 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på omkring 60-80 %, högst på natten och precis efter sprayning, eftersom arten lever i regnskog.
LJUS OCH UVB	*Lygodactylus fischeri* är dagaktiv och behöver kraftigt, jämnt ljus. Använd lysrör, helst T5, och kombinera ett UVB-rör med ett dagsljusrör så att terrariet blir ljust.
UTFODRING	I naturen lever *Lygodactylus fischeri* sannolikt mest av myror. I terrariet ska den få levande smådjur: hoppstjärtar, bananflugor, små syrsor, nykläckta bönvivlar, små kackerlackor och små gräshoppor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Lygodactylus fischeri* är liten, snabb och lever mycket dolt. Liksom andra dagaktiva dvärggeckor sitter den ofta orörlig på en gren och rusar sedan iväg efter ett foderdjur.
NATURLIG UTBREDNING	Nigeria, Kamerun, Ekvatorialguinea och Gabon.