herpy

GECKOR

Oedura castelnaui

Oedura castelnaui är en tillplattad, nattaktiv klättrare från öppen skog och savann i norra Queensland, särskilt på Kap Yorkhalvön. Den lever gömd på dagen och kommer fram när mörkret faller. Skötsel och avel bygger till stor del på erfarenheter med andra arter i släktet.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Northern velvet gecko Tidigare namn: *Phyllodactylus castelnaui; Oedura mayeri* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-75 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett enstaka vuxet djur av *Oedura castelnaui* ska ha ett högt terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Ett par behöver något mer, till exempel 60 × 45 × 60 cm.

TEMPERATUR

Håll dagtemperaturen på 24-28 °C och låt ett litet område nå 30-32 °C, till exempel under en låg lampa eller en värmematta på sidan. På natten får temperaturen sjunka till 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Håll luften på omkring 40-60 % med en kortvarig ökning till upp mot 70 % efter sprayning på kvällen. Låt terrariet torka upp under dagen. Ställ alltid en låg skål med friskt vatten i terrariet och byt den varje dag.

LJUS OCH UVB

Oedura castelnaui är nattaktiv, och UVB är inte nödvändigt. Ett svagt UVB-ljus är ändå ett rimligt val, så länge det också finns skugga.

UTFODRING

Oedura castelnaui lever av insekter. Ge levande foderdjur i lagom storlek: syrsor, dubiakackerlackor, gräshoppor och ibland mjölmaskar eller vaxmottslarver. Insekterna ska vara mindre än avståndet mellan djurets ögon.

BETEENDE OCH HANTERING

Liksom andra *Oedura*-arter är *Oedura castelnaui* troligen lugn, men gömd och snabb, och den vrider sig snabbt loss om man tar tag i den. Ta upp den inte oftare än nödvändigt.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.