herpy

GECKOR

Oedura monilis

Oedura monilis är en smal, nattaktiv klättrare från östra Australien med ett mönster av mörka ögonfläckar och breda tår som liknar små sugkoppar. Den lever i träd och på klippor, tar villigt foderinsekter och är en lugn, robust gecko för den som vill prova släktet *Oedura*.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Ocellated velvet gecko Tidigare namn: *Oedura ocellata; Oedura attenboroughi* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och klipplevande**
Biotop	**Savann, regnskog och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**29-33 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**3-5**
Inkubation	**55-70 dagar** vid 27-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett enstaka djur av *Oedura monilis*, ett par eller en hane med två honor kan hållas i ett terrarium på minst 50 × 30 × 40 cm (längd × bredd × höjd). Mer utrymme är ett bra val.
TEMPERATUR	Ge arten en omgivande dagtemperatur på omkring 24-27 °C och en varm plats på 29-33 °C, till exempel under en liten glödlampa som värmer en korkplatta.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	*Oedura monilis* trivs med måttlig luftfuktighet. Sikta på 40-60 %. Spraya terrariet 3-4 gånger i veckan.
LJUS OCH UVB	*Oedura monilis* är nattaktiv och har inget känt behov av UVB, och UVB gör ingen synlig skillnad. Om du ändå ger det ska det vara ett svagt ljus med gott om skugga (Ferguson-zon 1), och djuren ska kunna dra sig undan helt.
UTFODRING	*Oedura monilis* lever av insekter och tar nästan alla foderinsekter i lagom storlek: syrsor, gräshoppor, kackerlackor, mindre mjölmaskar och larver av svarta soldatflugor. Bytet får inte vara längre än geckons huvud är brett.
BETEENDE OCH HANTERING	*Oedura monilis* är ett lugnt och gömt djur som mest är aktivt efter mörkrets inbrott, men det kan ibland ses framme under dagtid. Om det känner sig hotat kröker det ryggen och viftar med svansen.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/oedura-monilis