herpy

GECKOR

Pristurus flavipunctatus

En liten, dagaktiv gecko från länderna kring södra delen av Röda havet, med en hög, sågtandad svans och gula fläckar. Den blir omkring 8 cm lång inklusive svansen, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln.

Familj: Sphaerodactylidae Engelska: Rüppell's semaphore gecko Tidigare namn: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-8 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**30-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**70-90 dagar** vid 28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Pristurus flavipunctatus*. Skötselråden bygger på klimatet i utbredningsområdet och på *Pristurus carteri*, den bäst kända arten i släktet i terrarier.
TEMPERATUR	Skapa en gradient med 28-30 °C i den svalare änden och en solplats på 40-45 °C under en spotlight. På natten får temperaturen sjunka till omkring 20-22 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luften ska vara torr, omkring 30-40 %. Ge en mycket låg skål med friskt vatten, eller lägg stenar i skålen så att djuret inte kan drunkna, och spraya inredningen lätt en gång i veckan så att djuren kan dricka droppar.
LJUS OCH UVB	*P. flavipunctatus* är dagaktiv och behöver kraftigt dagsljus och UVB över solplatsen, till exempel ett T5-rör. Ferguson-zon 3 är en uppskattning för en dagaktiv ökengecko; zonen har inte mätts för arten.
UTFODRING	Arten äter små leddjur. Ge hoppstjärtar, bananflugor, små syrsor och andra små insekter, inte bredare än djurets huvud. Mata vuxna djur varannan eller var tredje dag och ungdjur dagligen, och ta bort resterna efter 15-20 minuter.
BETEENDE OCH HANTERING	*Pristurus flavipunctatus* är snabb och vaksam och lämpar sig inte för hantering, och svansen kan brytas av. Djurens beteende mot varandra i fångenskap är inte dokumenterat.
NATURLIG UTBREDNING	Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia, Sudan, Sydsudan, Egypten och Saudiarabien.