herpy

GECKOR

Rhacodactylus trachyrhynchus

Rhacodactylus trachyrhynchus är en sällsynt, nattaktiv trädlevande gecko från Nya Kaledonien med råa fjäll på nosen och en ovanlig egenskap: Den föder levande ungar, vilket i släktet bara delas med en enda nära släkting. Arten är sårbar i naturen och bara sällan sedd i terrarier, och anvisningen bygger delvis på erfarenheter med de närmaste släktingarna.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Rough-snouted giant gecko Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-38 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-2 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**150-240 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Skötseln av *Rhacodactylus trachyrhynchus* är nästan okänd, så skötselråden är lånade från den nära besläktade *Rhacodactylus leachianus* och är ett försiktigt utgångsläge.

TEMPERATUR

För *Rhacodactylus trachyrhynchus* är 22-27 °C lämpligt på dagen, och på natten får det sjunka till 18-22 °C. En värmeplats behövs inte, eftersom arten är nattaktiv och hör hemma i ett milt klimat.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Håll luftfuktigheten för *Rhacodactylus trachyrhynchus* på 50-80 %. Spraya terrariet ordentligt på kvällen så att den stiger till 70-80 %, och låt den sjunka igen under dagen så att substrat och grenar hinner torka.

LJUS OCH UVB

Rhacodactylus trachyrhynchus är nattaktiv och klarar sig troligen som släktets övriga arter utan UVB när fodret innehåller D3-vitamin. UVB är därför valfritt.

UTFODRING

Rhacodactylus trachyrhynchus är troligen allätare som alla *Rhacodactylus*-arter, med insekter och frukt som huvudföda och ibland små ödlor, fågelungar och gnagare. En blandad kost är därför utgångspunkten.

BETEENDE OCH HANTERING

Hanarna av *Rhacodactylus trachyrhynchus* slåss ofta om de går ihop, medan honor är sociala och kan hållas tillsammans. Håll därför aldrig två hanar i samma terrarium. En hane kan hållas ensam eller med en eller två honor.

NATURLIG UTBREDNING

Nya Kaledonien.