herpy

GECKOR

Rhynchoedura ornata

Rhynchoedura ornata är en liten, slank och nattaktiv gecko från de sandiga öknarna i västra och centrala Australien. Den har en spetsig nos med ett näbbliknande drag, lever på marken och äter mest termiter. Det finns nästan ingen kunskap om skötseln, så skötselbeskrivningen bygger på livsmiljön och på släktingar från samma trakter.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Western beaked gecko Tidigare namn: *Diplodactylus paraornatus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-6 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-8 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Öken och halvöken**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 25 × 25 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Värmeplats	**30-34 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**30-45 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**10-12 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**46-60 dagar** vid 27-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Rhynchoedura ornata*, så rekommendationerna här bygger på livsmiljön i den australiska öknen och på den nära besläktade *Diplodactylus galeatus*, som bor i samma typ av landskap.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen är 25-28 °C, med en varm plats på 30-34 °C, till exempel under en liten lampa över en platt sten. Mät alltid med en digital termometer, eftersom värmen från en lampa varierar mycket.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Rhynchoedura ornata kommer från torra trakter och ska hållas torrt: sikta på 30-45 % luftfuktighet. Terrariet ska ventileras väl, och bottnen ska vara torr.

LJUS OCH UVB

Rhynchoedura ornata är nattaktiv och har inget dokumenterat behov av UVB. Ger du UVB ändå ska det vara ett svagt ljus (Ferguson-zon 1) med gott om skugga, så att geckon kan dra sig helt undan.

UTFODRING

Rhynchoedura ornata lever i naturen mest av termiter och dessutom av myror. Termiter är sällsynta som foderdjur, så erbjud små, mjuka foderinsekter: nykläckta och små syrsor, bananflugor, hoppstjärtar och små kackerlackor.

BETEENDE OCH HANTERING

Rhynchoedura ornata är ett lugnt, dolt och nattaktivt djur. På dagen syns det nästan inte, och på natten kan det ses springa omkring på sanden på jakt.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.