herpy

GECKOR

Sphaerodactylus torrei

En liten, dagaktiv gecko från sydöstra Kuba med tydlig skillnad mellan könen: hanen har gult huvud och klarorange svans, honan är ljus med mörka tvärband. *Sphaerodactylus torrei* blir bara omkring 8 cm inklusive svans, lägger ett ägg i taget och kräver små foderdjur och ett tätt slutet terrarium.

Familj: Sphaerodactylidae Engelska: Barbour's least gecko Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Värmeplats	**31-32 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**80-90 dagar** vid 26-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par av *Sphaerodactylus torrei* kan hållas i ett terrarium på 60 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd). Ett enstaka djur klarar sig i något mindre. Djuren är territoriella, så håll antingen ett djur eller ett par.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 26-28 °C, och ett litet område får under sommarhalvåret nå 31-32 °C. På natten sjunker temperaturen till omkring 24 °C. För en sval vinterperiod kan natten sänkas till omkring 18 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Håll den relativa luftfuktigheten på omkring 70-80 % genom att spraya terrariet dagligen eller varannan dag.
LJUS OCH UVB	*Sphaerodactylus torrei* är dagaktiv, och ett svagt UVB-ljus i Ferguson-zon 1 rekommenderas. Använd ett UVB-rör med låg styrka över ena halvan av terrariet, så att det alltid finns skugga.
UTFODRING	*Sphaerodactylus torrei* lever av små, levande byten. I naturen är det små syrsor, mott, flugor och skalbaggslarver, och i fångenskap passar små syrsor, bananflugor, små vaxmottslarver och små larver av svart soldatfluga.
BETEENDE OCH HANTERING	*Sphaerodactylus torrei* är territoriell och aggressiv, så den hålls enstaka eller som ett par med gott om gömslen och plats.
NATURLIG UTBREDNING	Kuba.