herpy

GECKOR

Strophurus intermedius

Strophurus intermedius är en kraftigt byggd taggsvansgecko från de halvtorra malleebuskagen och skogarna i södra Australien. Ryggen och svansen har två rader orangebruna knölar, och vid fara sprutar den ut en klibbig, illaluktande vätska ur svansen. Den klättrar i buskar och träd, men rör sig också mycket på marken.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Southern spiny-tailed gecko Tidigare namn: *Diplodactylus intermedius* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**2-5**
Inkubation	**45-60 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Taggsvansgeckor utnyttjar utrymmet väl, så terrariet behöver inte vara stort. Ett par eller en liten grupp kan hållas i 30 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd).

TEMPERATUR

Använd 25-30 °C på dagen och en solplats på 30-32 °C högt uppe på en gren. På natten stängs värmen av, och temperaturen får sjunka till 18-25 °C. Siffrorna är lånade från släktets övriga arter.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara måttlig, omkring 40-60 %, och terrariet ska torka upp helt under dagen. Spraya lätt på grenar och väggar ett par kvällar i veckan, så att djuret kan dricka droppar, och låt bottnen torka emellan.

LJUS OCH UVB

Arten solar sig ibland, så UVB är en fördel, särskilt för ungar och avelshonor.

UTFODRING

I naturen lever *Strophurus intermedius* uteslutande av leddjur: spindlar, skolopendrar, skorpioner, kackerlackor, syrsor, skalbaggar och deras larver. I terrariet passar små syrsor, kackerlackor, mott, flugor och vaxmottslarver.

BETEENDE OCH HANTERING

Strophurus intermedius är ett djur att titta på och bör inte hanteras mer än högst nödvändigt. Den kan spruta sin klibbiga, illaluktande vätska, och den kan tappa svansen. Ta aldrig tag i svansen.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.