herpy

GECKOR

Strophurus williamsi

Strophurus williamsi är en liten trädlevande gecko från det torra inlandet i östra Australien. Ryggen och svansen är täckta av gulorange taggar, och när den hotas sprutar den ut en seg, illaluktande vätska ur svansen. Den solar gärna på dagen men jagar mest i skymningen och på natten. Det finns bara få tillförlitliga uppgifter om skötseln av just den här arten, så den passar bäst för erfarna hållare.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Eastern spiny-tailed gecko Tidigare namn: *Diplodactylus williamsi* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**10-13 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**4-10 år**
Aktiv	**På dagen, i skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**2-5**
Inkubation	**43-80 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan inga utförliga skötselanvisningar för *Strophurus williamsi*, så måtten här bygger på erfarenheter med taggsvansgeckor i allmänhet.
TEMPERATUR	*Strophurus williamsi* är värmekrävande och lever i ett klimat med stor dygnsvariation. Använd en dagtemperatur på 25-30 °C i terrariet och en solplats på omkring 30-32 °C, som geckon kan söka sig till och lämna igen.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	För *Strophurus williamsi* ska luftfuktigheten vara måttlig, omkring 40-60 %, och terrariet ska torka upp helt under dagen.
LJUS OCH UVB	*Strophurus williamsi* solar i naturen, så den har nytta av UVB.
UTFODRING	I naturen lever *Strophurus williamsi* av leddjur, framför allt syrsor, gräshoppor, nattfjärilar, spindlar och termiter. Ge i fångenskap en varierad blandning av små foderinsekter som syrsor, små kackerlackor och små gräshoppor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Strophurus williamsi* är mest ett djur att titta på. Den är snabb och nervös och bör inte hanteras mer än absolut nödvändigt.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.