herpy

GECKOR

Thecadactylus rapicauda

En av Amerikas största geckor: en nattaktiv väntjägare utan rörliga ögonlock, med lodräta pupiller, blå tunga och en svans som växer ut tjock som en rova efter ett förlorat. Arten är utbredd från Mexiko till Brasilien, men är sällsynt i terrarier, och det finns bara få pålitliga uppgifter om skötsel.

Familj: Phyllodactylidae Engelska: Turnip-tailed gecko Tidigare namn: *Gekko rapicauda; Gekko laevis; Platydactylus theconyx* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-13 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**16-40 g**
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Värmeplats	**30-31 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**150-200 dagar** vid 24-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara få erfarenheter av arten i fångenskap, så måtten bygger på de allmänna kraven för nattaktiva, klättrande geckor från fuktiga trakter.
TEMPERATUR	Arten är aktiv inom ett förhållandevis snävt temperaturområde. På dagen passar 25-28 °C, och en något varmare plats på 30-31 °C högst upp i terrariet ger djuret möjlighet att välja.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten behöver hög luftfuktighet. I det vilda anges omkring 60 % som idealiskt, och 60-80 % är ett rimligt mål i terrariet, där fuktigheten stiger efter en sprayning på kvällen och sjunker under dagen.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och gömmer sig i mörka springor på dagen, så UVB är inte nödvändigt när fodret får kalk och D3-vitamin.
UTFODRING	I det vilda är arten en väntjägare med ett mycket brett födoval. Mageninnehåll från vilda djur visar gräshoppor, kackerlackor, skalbaggar, fjärilar, spindlar och skorpioner, och den tar i sällsynta fall också små grodor och ödlor.
BETEENDE OCH HANTERING	Djuret är långsamt och sävligt när det inte är hotat, men kan vara kvickt och aggressivt när det blir störd. Det kan bita hårt, och svansen kastar det vid ringa tryck.
NATURLIG UTBREDNING	Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Trinidad och Tobago, Aruba, Curaçao, Karibiska Nederländerna, Antigua och Barbuda, S:t Lucia och Grenada.