herpy

GECKOR

Uroplatus henkeli

En av de största bladsvansgeckorna, från skogarna i nordvästra Madagaskar. På dagen ligger den platt och nästan osynlig på en trädstam, och på natten jagar den i grenarna. Den är lugn mot artfränder och kan föras upp, men den tål varken värme eller torka och hör hemma hos en erfaren hållare.

Familj: Gekkonidae Engelska: Henkel's leaf-tailed gecko Publicerad 14 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-30 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**50-80 g**
Livslängd	**7-11 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**1-5**
Inkubation	**100-230 dagar** vid 18-26 °C

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 100 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**60-100 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par behöver ett terrarium på minst 60 × 60 × 100 cm (längd × bredd × höjd), och en grupp på tre till fem djur passar i 90 × 90 × 120 cm.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 22-26 °C, och på natten ska temperaturen sjunka till 17-21 °C. Nattsänkningen är viktig för välbefinnandet, men ligger natten konstant i den kalla änden kan honorna få svårt att lägga sina ägg.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara hög: från omkring 60 % under dagen och upp mot 100 % direkt efter sprayning. Spraya en till två gånger om dagen, så att det bildas droppar på blad och glas, som djuren dricker.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och har länge hållits utan UVB, och det råder fortfarande oenighet om hur nödvändigt det är. Det är en god idé att erbjuda det, eftersom djuren i naturen får spritt UV-ljus genom lövverket.

UTFODRING

Uroplatus henkeli lever av insekter och andra smådjur. Ge en varierad blandning av syrsor, gräshoppor, kackerlackor (t.ex. dubia), vaxmott-larver och andra foderdjur, som själva har fått bra foder de sista 24-48 timmarna.

BETEENDE OCH HANTERING

På dagen sitter geckon helt stilla och kamouflerad på en stam eller på glaset. Den är ett djur att titta på, inte att hålla i. Beröring stressar den, och den kan kasta svansen, som växer ut igen och liknar den gamla.

NATURLIG UTBREDNING

Madagaskar.