herpy

GRODOR

Blue-sided Treefrog

Agalychnis annae

Agalychnis annae är en 6-8 cm stor lövgroda från bergsskogarna i Costa Rica: grön på ryggen, med orange ögon och himmelsblå sidor och lår. Den är nattaktiv, lever högt uppe i vegetationen och är sårbar i naturen. Arten kräver ett svalt och luftigt terrarium: på dagen 20-24 °C och relativt torr luft, och först på kvällen sprayas det kraftigt.

Familj: Phyllomedusidae Tidigare namn: *Phyllomedusa annae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-18 °C**
Luftfuktighet	**50-75 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Ägg per läggning	**47-162**
Kläckning	**5-8 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**60-250 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite direkt skötselkunskap om *Agalychnis annae*, och siffrorna här är därför delvis lånade från *Agalychnis moreletii*, som lever på samma höjd och i samma typ av bergsskog och har samma krav.

TEMPERATUR

Agalychnis annae kommer från högre belägna skogar än de mer kända lövgrodorna och tål inte värme under längre tid. På dagen ska det vara 20-24 °C, och temperaturen bör inte komma över 25 °C, inte ens kortvarigt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten hålls på 50-75 % på dagen, medan grodorna sover. På kvällen, när ljuset släcks, sprayas terrariet kraftigt, så att luftfuktigheten stiger till 80-100 % och sjunker igen under natten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Det ska alltid finnas en skål med rent vatten i terrariet. En skål på omkring 20 cm i diameter med 2-3 cm vatten räcker, och grodorna ska lätt kunna ta sig upp igen; släta stenar i skålen hindrar att mindre djur drunknar.

LJUS OCH UVB

UVB rekommenderas, eftersom D-vitamin behövs för kalkomsättningen, och insekter innehåller nästan inget. Ferguson-zon 3 är lånad från *Agalychnis moreletii*: ett genomsnittligt UV-index på 1-2,6 på de platser där grodorna vilar.

UTFODRING

Agalychnis annae äter bara insekter. Bruna syrsor är det bästa basfodret, när de matats upp med näringsrikt foder ett par dagar innan grodorna får dem. Även kackerlackor, vaxmasklarver och husflugor (och deras larver) tas.

BETEENDE OCH HANTERING

Agalychnis annae sover på dagen på blad och är aktiv på natten. Den rör sig långsamt och klättrar hand över hand, men hoppar långt när den blir skrämd, så öppna terrariet försiktigt.

NATURLIG UTBREDNING

Costa Rica.