herpy

GRODOR

Black-eyed Leaf Frog

Agalychnis moreletii

Agalychnis moreletii är en 6-9 cm stor lövgroda från bergsskogarna i Mexiko och Centralamerika: grön på ryggen, med djupsvarta ögon och orange sidor och lår. Den är nattaktiv och lever högt uppe i träden. Den kräver svalare och torrare förhållanden än de flesta släktingar: på dagen ska terrariet vara torrt och under 24 °C, och först på kvällen sprayas det fuktigt.

Familj: Phyllomedusidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-9 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**6-25 g**
Livslängd	**5-11 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Värmeplats	**25 °C**
Temperatur, natt	**15-18 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Ägg per läggning	**23-334**
Kläckning	**7-11 dagar** vid 20-24 °C
Larvtid	**60-100 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Agalychnis moreletii lever i träden, så höjden är viktigare än golvytan. Ett terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm rymmer en liten grupp på fyra djur.

TEMPERATUR

Agalychnis moreletii är en bergsart och ska hållas svalare än den mer kända *Agalychnis callidryas*. På dagen ska det vara 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Torr luft på dagen är avgörande för *Agalychnis moreletii*. Luftfuktigheten hålls på 50-70 % på dagen, medan grodorna sover, utanför yngeltiden gärna omkring 60 %.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Det ska alltid stå en skål med rent vatten i terrariet. En skål på omkring 20 cm i diameter med 2-3 cm vatten räcker, och grodorna ska lätt kunna ta sig upp igen.

LJUS OCH UVB

UVB rekommenderas, eftersom D-vitamin är nödvändigt för kalkomsättningen och insekter innehåller nästan inget.

UTFODRING

Agalychnis moreletii äter bara insekter. Bruna syrsor (*Acheta domesticus*) är det bästa baskostet när de har matats upp med näringsrik föda, till exempel frukt, grönsaker och riven morot, i 48 timmar innan grodorna får dem.

BETEENDE OCH HANTERING

Agalychnis moreletii sover på dagen på blad och är aktiv på natten. Den rör sig långsamt och klättrar hand över hand, men hoppar långt när den blir skrämd, så öppna terrariet försiktigt.

NATURLIG UTBREDNING

Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras och El Salvador.