herpy

GRODOR

Gliding Leaf Frog

Agalychnis spurrelli

Agalychnis spurrelli är en 5-9 cm stor lövgroda från de fuktiga låglandsskogarna i Costa Rica, Panama, Colombia och Ecuador: grön på ryggen med vita fläckar, orange sidor och en mörkröd regnbågshinna i ögat. Den är nattaktiv, bor högt uppe i träden och kan glida från gren till gren på sin stora simhud. I terrariet är den härdig och förökar sig lätt, när terrariet hålls rent och torkar upp på dagen.

Familj: Phyllomedusidae Tidigare namn: *Agalychnis litodryas*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-9 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**65-75 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**30-110**
Kläckning	**7-9 dagar** vid 24-26 °C
Larvtid	**42-63 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Agalychnis spurrelli bor högt uppe i vegetationen, så terrariets höjd och antalet grenar är viktigare än golvytan. Ett terrarium på minst 60 × 45 × 60 cm rymmer en liten grupp på fyra djur.

TEMPERATUR

På dagen hålls terrariet på 22-27 °C, och på natten får temperaturen sjunka 3-5 °C till 20-23 °C. Det behövs ingen varm hotspot: en lätt uppvärmning av rummet eller en värmematta på sidan av terrariet räcker.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten hålls på 65-75 % utanför lektiden. Terrariet sprayas kraftigt på kvällen, kort före ljuset släcks, så att luftfuktigheten stiger till 80-100 % under några timmar och sjunker igen under natten och dagen.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Det ska alltid stå en stor, låg skål med rent vatten i terrariet, där grodorna lätt kan ta sig upp och ner. Vattendjupet är 2-3 cm. Grodorna kissar och bajsar ofta i vattnet, så skålen töms, skrubbas och fylls varje dag.

LJUS OCH UVB

Terrariet ska ha 12 timmars ljus och 12 timmars mörker. Växtljus av LED eller lysrör ger växterna det de behöver och djuren en tydlig dag.

UTFODRING

Agalychnis spurrelli äter levande insekter. Bruna syrsor i lämplig storlek är basfoder, kompletterade med till exempel kackerlackor, vaxmasklarver och husflugor.

BETEENDE OCH HANTERING

Agalychnis spurrelli är lugn och nattaktiv. Hanarna är inte aggressiva mot varandra utanför lektiden, och flera hanar och båda könen kan hållas tillsammans så länge det finns tillräckligt med utrymme.

NATURLIG UTBREDNING

Costa Rica, Panama, Colombia och Ecuador.