herpy

GRODOR

Large-webbed Bell Toad

Bombina maxima

Bombina maxima är den största arten i släktet: en kraftig, gråbrun och starkt vårtig groda på 6-8 cm med en orange buk, marmorerad med svart, som den visar upp när den känner sig hotad. Den kommer från bergen i sydvästra Kina och vill ha rent, svalt vatten och ett svalt terrarium. Den är lätt att sköta när temperaturen hålls nere, men ställer större krav på vattenkvaliteten än *Bombina orientalis*.

Familj: Bombinatoridae Tidigare namn: *Bombinator maximus* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**6-15 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-23 °C**
Temperatur, natt	**12-17 °C**
Luftfuktighet	**60-85 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 5-10 cm
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**4-8 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Ägg per läggning	**20-150**
Kläckning	**3-10 dagar** vid 18-22 °C
Larvtid	**30-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Arten ska ha ett akvaterrarium, där omkring två tredjedelar av botten är vatten och en tredjedel land. Fyra vuxna djur ska ha minst 80 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Arten kommer från svalt höglandet och ska hållas svalare än de flesta grodor. På dagen är 18-23 °C lämpligt, och temperaturen bör aldrig komma över 25 °C. På natten får den gärna sjunka till 12-17 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 60-85 %. Den stora vattendelen gör det mesta av arbetet, så det räcker att spraya landdelen lätt en gång om dagen.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet ska vara 5-10 cm djupt, och djuren ska alltid lätt kunna ta sig upp, till exempel via sneda rötter, platta stenar eller växter. Vattnet har samma temperatur som rummet och ska inte värmas.
LJUS OCH UVB	Ge 12 timmars ljus om dagen under sommarhalvåret och något kortare dagar på vintern, styrt av en timer. En LED-armatur med dagsljusspektrum ger tillräckligt med ljus för växterna.
UTFODRING	Fodret ska röra sig. Ge vanliga foderinsekter i lämplig storlek: syrsor, flugor, gråsuggor, daggmaskar och små sniglar. Mjölmaskar är feta och ges bara då och då.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är aktiv på dagen och i skymningen och syns ofta öppet framme, på land eller flytande i ytan. Den hålls bäst i grupp. Under lektiden blir det livligt när hanarna ropar från vattnet.
NATURLIG UTBREDNING	Kina.