herpy

GRODOR

## Gulbukig klockgroda

# *Bombina variegata*

*Bombina variegata* är en liten, kompakt groda på 3-6 cm med grå-brun, spetsvårtig rygg och en skarpt gul och blågrå buk, som den visar upp när den känner sig hotad. Arten lever i berg- och kullandskapen i Mellan- och Sydeuropa, tycker om små, solvarma vattenhål och är härdig, nyfiken och långlivad i terrariet. Den kräver svala temperaturer och en sval vintervila, men i övrigt bara lite utrymme.

Familj: Bombinatoridae  Engelska: Yellow-bellied Toad  **Mild hudgift**

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **3-6 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Vikt | **2,3-12 g** |
| Livslängd | **10-20 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Semiakvatisk** |
| Biotop | **Våtmark och tempererad skog och äng** |
| Hudgift | **Mild**<br>Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun |
| Svårighetsgrad | **Nybörjare** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodyngel i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Könsmogen | **12-24 mån.** |
| Ägg per läggning | **40-170** |
| Läggningar per år | **1-3** |
| Kläckning | **2-3 dagar** |
| Larvtid | **25-70 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Ingen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H för 4 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **20-24 °C** |
| Temperatur, natt | **16-20 °C** |
| Luftfuktighet | **60-80 %** |
| Vatten | **Vattendel**<br>djup 5-10 cm |
| UVB | **Valfritt** |
| Vintervila | **5-10 °C**<br>8-12 veckor |
| Föda | **Insekter och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Parvis eller i grupp** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Det finns inte många detaljerade skötselbeskrivningar av *Bombina variegata*. Rekommendationerna här bygger på artens levnadssätt och på den nära släktingen *Bombina orientalis*, som är långt bättre känd i fångenskap.

**TEMPERATUR**

Arten är anpassad till ett tempererat klimat och ska inte ha värme som de flesta terrariedjur. På dagen är 20-24 °C lämpligt, och på natten ska det vara lite svalare, 16-20 °C.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**

Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %. Den stora vattendelen håller det mesta av fukten, så det räcker normalt att spraya landdelen lätt en gång om dagen, särskilt i ett torrt rum på vintern.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**

Vattendelen ska fylla omkring hälften av botten och vara 5-10 cm djup. Djuren ligger gärna i ytan eller på flytande växter och ska lätt kunna ta sig upp på land, till exempel via sneda rötter, platta stenar eller växter.

**LJUS OCH UVB**

Ge 12-14 timmars ljus på sommaren och ner till omkring 10 timmar på vintern, styrt av en timer. En LED-armatur ger grundljuset och får växterna att trivas. Det behövs ingen värmelampa. UVB är valfritt.

**UTFODRING**

*B. variegata* har stor aptit och tar allt levande som är litet nog att rymmas i munnen: syrsor, hussyrsor, bananflugor, flugor, gråsuggor, silverfiskar, små daggmaskar och små sniglar.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*B. variegata* är nyfiken och sällskaplig och kan hållas i par eller i grupper. Djuren bör vara ungefär lika stora, eftersom stora djur kan äta små, och vid utfodring kan de bli lite påträngande.

**NATURLIG UTBREDNING**

Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Österrike, Italien, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern, Rumänien, Moldavien, Ukraina, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien och Grekland.