herpy

GRODOR

Amazonian Horned Frog

Ceratophrys cornuta

Ceratophrys cornuta är en kraftig, bredmunnad groda från regnskogen i Amazonas och Guyanaregionen, som ligger nedgrävd i lövlagret med bara ögon och horn synliga och slår till när något ätbart kommer förbi. Honorna blir upp till 15 cm, och munnen kan ta byte som är nästan lika stort som de själva. Som regnskogsart ska den ha mer fukt än släktingarna från de torra slätterna längre söderut.

Familj: Ceratophryidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-15 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**23-25 °C**
Luftfuktighet	**75-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Ägg per läggning	**300-1 000**
Kläckning	**3-25 dagar**
Larvtid	**28-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns relativt lite kunskap om skötseln av *Ceratophrys cornuta*, eftersom arten föds upp långt mer sällan än *Ceratophrys cranwelli* och *Ceratophrys ornata*.

TEMPERATUR

På dagen hålls terrariet på 25-28 °C och på natten på 23-25 °C. Siffrorna är lånade från släktets övriga arter och ligger i den varma änden, eftersom *C. cornuta* kommer från varm regnskog.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten hålls på 75-90 % hela året, högre än för de besläktade arterna från Pampas och Chaco, eftersom arten kommer från regnskog.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge alltid en låg skål med färskt, behandlat vatten, stor nog för att hela grodan ska kunna ligga i den, men med vattenstånd högst upp till grodans mun.

LJUS OCH UVB

UVB är inte nödvändigt, men ett svagt UVB-rör (Ferguson-zon 1) kan vara till nytta. Häng det över ena sidan, så att det alltid finns skugga i resten, och avstå från UVB till albinodjur, som är ljuskänsliga.

UTFODRING

Arten äter nästan allt som får plats i munnen. I naturen äter den grodor, fiskar, ödlor, möss och andra ryggradsdjur samt stora insekter.

BETEENDE OCH HANTERING

Ceratophrys cornuta är en stillasittande groda som ligger nedgrävd större delen av tiden och bara kommer fram för att äta. Fullvuxna djur är aggressiva och kan hoppa efter en hand som kommer för nära, och bettet gör ont.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Guyana, Surinam och Franska Guyana.