herpy

GRODOR

Tomatgroda

Dyscophus antongilii

Dyscophus antongilii är en groda från Madagaskars nordöstra lågland: rund, kraftig och enhetligt orange till djupt röd. Honan blir upp till 11 cm och över 200 g, hanen är mindre och mer dämpad. Den ligger nedgrävd på dagen och jagar på natten, och den är lugn och robust att hålla när temperatur, fukt och hygien är i ordning.

Familj: Microhylidae Engelska: Tomato Frog **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-11 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**40-230 g**
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**9-24 mån.**
Ägg per läggning	**1 000-1 500**
Kläckning	**1-2 dagar**
Larvtid	**45 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par eller tre djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 35 × 35 cm (längd × bredd × höjd). Bottenytan betyder mer än höjden, för *D. antongilii* lever på marken och gräver.

TEMPERATUR
Dyscophus antongilii tål ett brett temperaturspann och trivs vid vanlig rumstemperatur. På dagen ska det vara 23-27 °C och på natten 18-21 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %. Spraya lätt en gång om dagen eller varannan till var tredje dag, beroende på hur snabbt terrariet torkar, och använd en hygrometer.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ställ in en vattenskål med avklorerat vatten, så stor att grodan kan sitta i den, och minst så djup som grodan är hög. De flesta grodor badar i skålen på natten, så byt vattnet varje morgon.

LJUS OCH UVB
Arten är nattaktiv och behöver inte UVB, men ett svagt UVB-ljus (ungefär Ferguson-zon 1) skadar inte och kan ges. För levande växter används ett dagsljusrör som till akvarier.

UTFODRING
Dyscophus antongilii äter bara levande foder.

BETEENDE OCH HANTERING
Dyscophus antongilii är lugn och hemlighetsfull. Den ligger större delen av dagen nedgrävd och kommer fram på natten. Vuxna djur kan bli något tama, men tål i bästa fall hantering, så ta bara upp den när det är nödvändigt.

NATURLIG UTBREDNING
Madagaskar.