herpy

GRODOR

Sambava Tomato Frog

Dyscophus guineti

Dyscophus guineti är en kraftig, rund och halvt grävande groda från Madagaskars östra regnskog. Honan är rödorange och upp till 10 cm, hanen mindre och mer gulaktig. På dagen ligger den nergrävd, på natten jagar den, och den är lugn och robust att hålla när temperatur, fukt och hygien är i ordning.

Familj: Microhylidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**9-24 mån.**
Ägg per läggning	**200-3 000**
Kläckning	**2-4 dagar**
Larvtid	**28-45 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par eller tre djur behöver ett terrarium på minst 60 × 35 × 35 cm (längd × bredd × höjd). Bottenytan betyder mer än höjden, för *D. guineti* lever på marken och gräver.
TEMPERATUR	*Dyscophus guineti* tål ett brett temperaturspann och trivs bra vid vanlig rumstemperatur. På dagen ska det vara 22-27 °C och på natten 18-21 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %. Duscha lätt en gång om dagen eller varannan till var tredje dag, beroende på hur snabbt terrariet torkar, och använd en hygrometer.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ in en vattenskål med avklorerat vatten, så stor att grodan kan sitta i den, och minst så djup som grodan är hög. De flesta grodor badar i skålen på natten, så byt vattnet varje morgon.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och behöver inte UVB, men ett svagt UVB-ljus (ungefär Ferguson-zon 1) skadar inte och kan ges. För levande växter används ett dagsljusrör som för akvarier.
UTFODRING	*Dyscophus guineti* äter bara levande föda.
BETEENDE OCH HANTERING	*Dyscophus guineti* är lugn och hemlighetsfull. Den ligger största delen av dagen nergrävd och kommer fram på natten. Vuxna djur kan bli något tama, men tål i bästa fall hantering, så ta bara upp den när det är nödvändigt.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.