herpy

GRODOR

Riggenbach's Reed Frog

Hyperolius riggenbachi

En liten, färgstark höglandsgroda från Kamerun och östra Nigeria, med slingrande teckningar i svart, rött och gult och en orange till röd buk. *Hyperolius riggenbachi* är nattaktiv, lever av små insekter, kräver ett högt, ljust terrarium och leker i vatten när regnet sätter in.

Familj: Hyperoliidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-12 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**65-80 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 3-5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**12 mån.**
Ägg per läggning	**30-300**
Kläckning	**6-8 dagar**
Larvtid	**45-120 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Fyra vuxna djur behöver ett terrarium på minst 60 × 30 × 40 cm (längd × bredd × höjd). *H. riggenbachi* blir större än de helt små vassgrodorna, och grodorna är snabba och utnyttjar all plats, så större är bättre.
TEMPERATUR	Dagtid ska temperaturen i terrariet vara 21-26 °C, och på natten får den sjunka till 17-20 °C. En nedgång på omkring 5 °C på natten motsvarar en högländsart och är nyttig. Släck all belysning på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 65-80 %. Värdet är inte dokumenterat för arten, utan lånat från *Hyperolius pickersgilli*. Spruta terrariet med ljummet, rent vatten varje kväll när grodorna vaknar, och gärna lätt igen under dagen.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ in en bred, låg vattenskål med 3-5 cm djup i terrariet och håll den full hela tiden. Grodorna sitter ofta i vattnet på natten och dyker ned när de blir skrämda.
LJUS OCH UVB	Grodan har nytta av kraftigt ljus, så ett ljust terrarium är en bra utgångspunkt. Använd lysrör eller LED med en färgtemperatur på 5.000-6.500 K som täcker terrariets hela längd, och tänd dem 12 timmar per dag med en timer.
UTFODRING	Grodan är en glupsk liten jägare och tar de flesta insekter som är lika stora som huvudet eller mindre. Grundfodret är små syrsor på 6-10 mm och flygdugliga bananflugor. Variera med husflugor och små nattfjärilar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Hyperolius riggenbachi* är nattaktiv och snabb. På dagen sitter djuren stilla på blad och rutor, och på natten jagar de, simmar i vattenskålen och kväker.
NATURLIG UTBREDNING	Kamerun och Nigeria.