herpy

GRODOR

Common Reed Frog

Hyperolius viridiflavus

En liten, snabb vassgroda från östra och centrala Afrika som från savannens vattenhål till trädgårdar och åkrar lockar som en xylofon i skymningen. *Hyperolius viridiflavus* byter färg med ålder och kön, är nattaktiv och lever av små insekter. Den kräver ett högt, ljust terrarium med många växter och leker i vatten när regnet sätter in.

Familj: Hyperoliidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**2-3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**1-2 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 45 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 3-5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**4-12 mån.**
Ägg per läggning	**94-800**
Kläckning	**2-5 dagar**
Larvtid	**56-120 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Fyra vuxna djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd). Arten är liten men snabb och utnyttjar hela terrariet, så höjd och många sittplatser är viktigare än golvyta.

TEMPERATUR

På dagen ska temperaturen i terrariet vara 22-27 °C och på natten 18-21 °C. En sänkning på omkring 5 °C på natten är naturlig och hälsosam. All belysning släcks på natten.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 60-80 %. Spraya terrariet med rent, ljummet vatten varje kväll när grodorna vaknar, och gärna lätt igen under dagen. Grodorna dricker och tar upp vatten från blad och väggar, så fuktiga blad är viktiga.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ställ en bred, låg vattenskål på 3-5 cm djup i terrariet och håll den full hela tiden. Grodorna är bra simmare, sitter ofta i vattnet på natten och dyker ner när de blir skrämda.

LJUS OCH UVB

Arten behöver kraftigt ljus. Använd lysrör eller LED med en färgtemperatur på 5.000-6.500 K som täcker hela terrariets längd, och tänd dem 12 timmar om dagen på en timer. Kraftigt vitt ljus främjar färger och aktivitet.

UTFODRING

Arten är en glupsk liten jägare som tar de flesta insekter som är lika stora som huvudet eller mindre. Baskosten är små syrsor på 5-8 mm och flygduktiga bananflugor. Variera med husflugor och små nattfjärilar.

BETEENDE OCH HANTERING

Hyperolius viridiflavus är nattaktiv och snabb. På dagen sitter djuren stilla på blad och rutor, och på natten jagar de, simmar i vattenskålen och lockar. Lätet är tonalt och liknar en xylofon.

NATURLIG UTBREDNING

Etiopien, Sydsudan, Sudan, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo-Kinshasa och Tanzania.