herpy

GRODOR

Llanos Frog

Lepidobatrachus llanensis

Lepidobatrachus llanensis är en bred, tillplattad vattengroda från det torra Gran Chaco i Sydamerika och den närmaste släktingen till *Lepidobatrachus laevis*. Den ligger på lur i grunt vatten, gräver ner sig och bildar en kokong under torrtiden. Arten är sällsynt i fångenskap, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln. Den ska bo ensam och biter, så den är ett djur att titta på, inte att ta upp.

Familj: Ceratophryidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Grävande och semiakvatisk**
Biotop	**Halvöken och savann**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 5-20 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**1 400**
Larvtid	**14 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns mycket lite kunskap om skötseln av *Lepidobatrachus llanensis*, och arten hålls bara sällan.
TEMPERATUR	På dagen hålls vatten och luft på 24-28 °C och på natten på 20-23 °C. Kallt vatten gör grodan ätovillig och mer mottaglig för sjukdom, så en termostatstyrd värmare behövs i de flesta bostäder. Över 30 °C kan snabbt bli farligt.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten hålls på 60-70 %, och det klarar den stora vattenytan nästan av sig själv. God ventilation är viktigare än fukt: minst hälften av locket ska vara nät, för stillastående, fuktig luft ger hudinfektioner.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är grodans hem, och vattenkvaliteten är det viktigaste i skötseln. Vattnet är 5-20 cm djupt, och grodan ska alltid kunna nå både ytan och land utan att simma.
LJUS OCH UVB	UVB behövs inte. Ett vanligt lysrör i 12 timmar om dagen ger en tydlig dygnsrytm. På natten ska det vara mörkt, för arten är troligen mest aktiv på kvällen och natten.
UTFODRING	Arten är ett rovdjur och tar allt den kan övermanna. Utfodringen är lånad från *L. laevis*: daggmaskar, syrsor, gräshoppor, kackerlackor och vaxmalslarver.
BETEENDE OCH HANTERING	*Lepidobatrachus llanensis* lever som ensamvarg och ska hållas ensam: grodynglen äter varandra, och vuxna grodor av släktet kan äta artfränder.
NATURLIG UTBREDNING	Argentina, Bolivia och Paraguay.