herpy

GRODOR

Amani Forest Treefrog

Leptopelis vermiculatus

En stor, storögd trädgroda från regnskogen i östra Tanzania som förekommer i en grön och en brun fas: grön med fina svarta fläckar eller brun med en mörk triangel på ryggen. *Leptopelis vermiculatus* är nattaktiv, blir upp till 9 cm och är sällsynt i fångenskap. Arten är hotad i naturen och kräver ett fuktigt, högt terrarium med svala nätter.

Familj: Arthroleptidae Tidigare namn: *Hylambates vermiculatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-9 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-8 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**65-85 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 3-5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**50-200**
Larvtid	**60-120 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Leptopelis vermiculatus*, och djur i handeln är ofta vildfångade.
TEMPERATUR	På dagen ska temperaturen i terrariet vara 22-27 °C, och på natten ska den sjunka till 18-21 °C. Nattsänkningen motsvarar ett höglandsklimat och är hälsosam.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 65-85 %. Spraya terrariet med ljummet, rent vatten en gång på kvällen och gärna lätt en gång till på morgonen, så att blad och väggar är våta och luften blir fuktig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ge djuren en bred, låg vattenskål med 3-5 cm vatten som hålls full hela tiden. Hanarna lockar medan de sitter i vatten, så skålen ska vara stor nog för att en hona och två hanar ska kunna sitta där.
LJUS OCH UVB	Arten är mest aktiv i skymningen och på natten och lever i skuggan under tät skog. Den ska ha ett lysrör eller en LED-lampa med en färgtemperatur på 5.000-6.500 K som täcker hela terrariet, så att växterna trivs.
UTFODRING	Arten tar alla insekter den kan överväldiga och är en glupsk jägare. Baskosten är medelstora till stora syrsor. Tropiska kackerlackor är ett bra tillskott, och de hålls lätt som egna foderkulturer.
BETEENDE OCH HANTERING	*Leptopelis vermiculatus* är nattaktiv och revirhävdande. På dagen sitter djuren stilla och gömda i växter, och i skymningen och på natten jagar de och lockar.
NATURLIG UTBREDNING	Tanzania.