herpy

GRODOR

Baron's Mantella

Mantella baroni

En liten, dagaktiv groda från de östra skogarna på Madagaskar, svart med orange och svarta tigerränder på bakbenen och ljusgröna fläckar vid extremiteterna. *Mantella baroni* blir omkring 3 cm, är en av de största i släktet och lever av myror och andra små leddjur. Den är lätt att hålla när terrariet står svalt, men tål inte värme.

Familj: Mantellidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**2-3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**16-18 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Ägg läggning	**På marken**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**50-130**
Kläckning	**3-12 dagar**
Larvtid	**42-56 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par kan hållas i ett terrarium på omkring 40 liter. Fyra vuxna djur behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 30 cm, och fler djur kräver mer golvyta.
TEMPERATUR	*Mantella baroni* trivs vid vanlig rumstemperatur, 21-24 °C på dagen, och på natten får temperaturen sjunka till 16-18 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Arten tål ett brett spann av luftfuktighet, men trivs bäst vid 60-70 % till vardags och upp till 80 % under lektiden. Spruta terrariet dagligen med avkalkat vatten, kraftigt i varmt väder och något mindre när det är kallt.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ in en låg vattenskål i terrariet och låt den alltid vara fylld. Grodorna är dåliga simmare, så skålen ska vara så låg att de lätt kan ta sig upp, och den får inte ta upp mycket av botten.
LJUS OCH UVB	Något UVB-behov är inte dokumenterat hos arten. Den är dock aktiv i delvis solljus i naturen, så ett svagt UVB-ljus (Ferguson-zon 1) är sannolikt en fördel när det finns skugga och växter, så att djuren kan välja.
UTFODRING	Grodan är en ivrig jägare och kan som vuxen äta större bytesdjur än de flesta andra arter i släktet. I naturen lever den mest av myror och av skalbaggar, spindlar och kvalster.
BETEENDE OCH HANTERING	*Mantella baroni* är dagaktiv och kan ses patrullera i sitt revir och jaga mat större delen av dagen. Hanarna kväker med korta, enkla klick under dagtid för att försvara området och locka honor, och de kan brottas med varandra.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/grodor/mantella-baroni