herpy

GRODOR

Ebenau's Golden Frog

Mantella ebenaui

Mantella ebenaui är en liten, dagaktiv groda från norra Madagaskar. Den är ljusbrun till kopparfärgad på ryggen, ofta med ett ljust X-mönster, och svart på sidorna, och den blir 20-26 mm. Arten har en av de största utbredningarna i släktet, tål värme bra och lägger äggen på land nära vatten. Det finns bara lite kunskap om skötseln av just denna art.

Familj: Mantellidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-26 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-8 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**I grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**25-30**
Larvtid	**56-70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Mantella ebenaui*, och arten har fått lite uppmärksamhet i hobbyn.
TEMPERATUR	Eftersom arten lever i låglandet tål den värme bättre än många andra i släktet. Använd 22-26 °C på dagen och 18-21 °C på natten; värdena är lånade från släktet och anpassade till artens låglandsklimat.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Håll luftfuktigheten på 70-100 %. Hög luftfuktighet får djuren att visa sig mer.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ en låg vattenskål i terrariet och håll den alltid fylld. Djupet är 1-2 cm, så att djuren lätt kan ta sig upp och ner. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat kranvatten och byt vattnet regelbundet.
LJUS OCH UVB	Ljuset ska passa växterna men får inte värma terrariet. Ge 10-12 timmars dag och mörker på natten. Det finns ingen dokumentation för att arten behöver UVB.
UTFODRING	Arten är mikrofag och äter små leddjur. Huvudfodret är bananflugor, hoppstjärtar, små gråsuggor och nykläckta syrsor. Variera fodret med bladlöss, kackerlacksungar, termiter och små vaxmottlarver, så att det inte uppstår brister.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är skygg i fångenskap och gömmer sig mycket, men kommer mer fram vid hög luftfuktighet och lagom värme. Hanarna är revirhävdande och försvarar platser där de kvittrar, medan honorna är mer tillbakadragna.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.