herpy

GRODOR

White-lipped Tree Frog

Nyctimystes infrafrenatus

Nyctimystes infrafrenatus är en stor, grön trädgroda på 11-14 cm och räknas som världens största trädgroda. Den lever i låglandet på Nya Guinea och omgivande öar och i nordöstra Australien, ofta nära människor. Den är lugn och sitter gärna framme, men behöver värme, ett stort och högt terrarium och en riktig vattendel.

Familj: Pelodryadidae Tidigare namn: *Litoria infrafrenata* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**11-14 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**30-60 g**
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**6-8 mån.**
Ägg per läggning	**100-6 000**
Kläckning	**1-2 dagar**
Larvtid	**42-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 90 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**60-95 %**
Vatten	**Vattendel** djup 10-15 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Två vuxna *N. infrafrenatus* kan hållas i ett terrarium på 90 × 45 × 90 cm. Fler djur kräver mer bottenyta. Arten är stor och klättrar, så ge både höjd och bottenyta, och låt terrariet vara välventilerat och helt tätt.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 20-22 °C på natten. Arten måste hållas varm: längre tids kyla under 15 °C är dödlig.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Håll luftfuktigheten på 60-95 %, och duscha terrariet dagligen med regnvatten eller avklorerat kranvatten. En stor vattendel med lite vattenrörelse gör det lätt att hålla fuktigheten i den höga änden.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*N. infrafrenatus* behöver en riktig vattendel på 10-15 cm; den håller kvar fukten och är nödvändig om djuren ska föröka sig. Den kan täcka en stor del av bottnen.
LJUS OCH UVB	Arten är övervägande nattaktiv, men vilar på dagen på platser med solljus, och hos djur som hållits helt utan UV-ljus har tillväxtstopp och missbildningar observerats.
UTFODRING	*N. infrafrenatus* äter nästan allt som rör sig och kan sväljas: syrsor, kackerlackor, vandringsgräshoppor, spyflugor, silkesmasklarver och daggmaskar. Vaxmalslarver och mjölmaskar är godsaker.
BETEENDE OCH HANTERING	*N. infrafrenatus* är lugn och nyfiken och sitter ofta synligt framme, även på dagen. Den hoppar inte mycket, utan väntar på att ett byte ska komma förbi och hoppar sedan de sista 10-15 cm.
NATURLIG UTBREDNING	Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea.