herpy

GRODOR

Cuban Treefrog

Osteopilus septentrionalis

Osteopilus septentrionalis är en stor, härdig lövgroda från Kuba, Bahamas och Caymanöarna. Honorna blir upp till 13 cm, huden kan skifta färg efter omgivningen, och de långa tårna med stora häftskivor gör den till en skicklig klättrare. Den är lätt att hålla, men högljudd, glupsk och har ett hudsekret som kan irritera ögon och slemhinnor.

Familj: Hylidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-13 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-13 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog, regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**4-8 mån.**
Ägg per läggning	**75-1 000**
Kläckning	**1-2 dagar**
Larvtid	**21-30 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett terrarium på 45 × 45 × 60 cm är minimum för 2 vuxna *Osteopilus septentrionalis*. Grodan är aktiv och klättrar mycket, så höjden betyder mer än golvytan, och större är bättre, särskilt för flera djur.

TEMPERATUR
På dagen hålls *Osteopilus septentrionalis* vid 24-29 °C med en svag gradient, så att grodan kan välja ett varmare eller svalare ställe. Den tål stora svängningar, men ihållande värme över ca 30 °C ger stress och uttorkning.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska ligga på 60-90 % med en tydlig rytm.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ställ fram en stor, låg vattenskål där *Osteopilus septentrionalis* kan sitta med det mesta av kroppen under vatten, 2-3 cm djup, så att grodan kan ta sig upp utan att kämpa.

LJUS OCH UVB
Det finns ingen dokumentation för att *Osteopilus septentrionalis* behöver UVB, men svagt UVB ger en tydlig dygnsrytm och kan främja aptit och aktivitet. Det är därför valfritt.

UTFODRING
Osteopilus septentrionalis är ett glupskt rovdjur som äter allt av lämplig storlek. Ge varierade insekter: syrsor, gräshoppor, kackerlackor, bananflugor, mjöl- och vaxmaskar, silkesmaskar och små daggmaskar.

BETEENDE OCH HANTERING
Osteopilus septentrionalis är en nattaktiv och skygg groda som sover i ett gömställe på dagen. Hanarna ropar högt på natten med ett skorrande, skällande läte som hörs långt och liknar en liten hund.

NATURLIG UTBREDNING
Kuba, Bahamas och Caymanöarna.