herpy

GRODOR

Red-legged Kassina

Phlyctimantis maculatus

Phlyctimantis maculatus är en slank, nattaktiv groda från Östafrika och nordöstra Sydafrika med gråbrun, mörkfläckig rygg och knallröda fält på insidan av bakbenen. Den går och springer hellre än hoppar, klättrar i grenar på natten och gräver ner sig på dagen. Arten är härdig och kan hållas i par eller små grupper, men grodynglen behöver ovanligt lång tid på sig för att bli till grodor.

Familj: Hyperoliidae Tidigare namn: *Kassina maculata; Hylambates maculatus* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**6-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**75 × 60 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattendel** djup 5 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**300**
Läggningar per år	**2-3**
Kläckning	**3-5 dagar** vid 24 °C
Larvtid	**150-300 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par eller en trio ska ha ett terrarium på minst 75 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och stor botten är viktigare än höjd: *Phlyctimantis maculatus* lever mest på marken, men klättrar gärna upp till omkring 50 cm.

TEMPERATUR
På dagen hålls terrariet på 22-27 °C, något varmare i ena änden än i den andra, och på natten på 20-23 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ligger på dagen på 60-70 % och får gärna stiga till 70-80 % på natten. Spraya varje kväll med ljummet vatten, gärna med ett tidsstyrt spraysystem, så att fuktigheten stiger när ljuset släcks.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Terrariet ska ha en vattendel som täcker ungefär en fjärdedel av bottnen, med omkring 5 cm vatten och låga kanter eller en gren, så att grodorna lätt tar sig upp igen.

LJUS OCH UVB
UVB rekommenderas, eftersom D3 i pulverform ensamt inte är en säker lösning. Ett UV-index på 2-3 vid den varmaste platsen (Ferguson-zon 2) är lämpligt, med skugga i resten av terrariet så att grodorna själva kan välja.

UTFODRING
P. maculatus äter insekter och i naturen även mindre grodor. I terrariet används syrsor, gräshoppor, flugor, malar och kalkmaskar, och foderdjuren får högst vara lika stora som avståndet mellan grodans ögon.

BETEENDE OCH HANTERING
P. maculatus är skygg och ligger större delen av dagen gömd eller nedgrävd. På natten blir den aktiv, klättrar och går på jakt. Hanarna ropar med ett högt, kort kvack som upprepas med mellanrum.

NATURLIG UTBREDNING
Kenya, Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Sydafrika och Eswatini.