herpy

GRODOR

Red-banded Rubber Frog

Phrynomantis bifasciatus

Phrynomantis bifasciatus är en kompakt, slät och glänsande groda från södra och östra Afrika. Den är svart med skarpa röda till krämfärgade band, går mer än den hoppar och äter helst myror och andra små leddjur. Hudsekretet är giftigt för andra grodor, så arten får inte hållas tillsammans med andra arter.

Familj: Microhylidae Tidigare namn: *Phrynomerus bifasciatus* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-7 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Savann**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Ägg per läggning	**300-1 500**
Kläckning	**4 dagar**
Larvtid	**30-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Phrynomantis bifasciatus*, och rekommendationerna bygger på artens livsmiljö och de fåtaliga erfarenheter som finns.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 24-29 °C och på natten 20-23 °C. Arten kommer från varmt, halvtorrt land och trivs bäst i den varma delen av spannet. Nattemperaturen är inte känd för arten; 20-23 °C passar klimatet i utbredningsområdet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 50-70 %. Arten kommer från torr till fuktig savannmark och är mer torktålig än de flesta grodor, men den kan fortfarande torka ut.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ en stor, låg skål med rent vatten i terrariet, så stor att grodan kan ligga i den och så låg att den lätt kommer upp igen. Amfibier tar upp vatten och ämnen genom huden, så vattnet ska vara utan klor och kloramin.
LJUS OCH UVB	*Phrynomantis bifasciatus* har inget känt behov av UVB, men svagt UVB kan ges och gynnar växterna. Vanligt terrarieljus i 10-12 timmar om dagen ger en tydlig dygnsrytm.
UTFODRING	*Phrynomantis bifasciatus* har en liten mun och tar helst små bytesdjur. I naturen består kosten mest av myror och termiter, men också andra små leddjur som gräshoppor och spindlar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Phrynomantis bifasciatus* är en lugn groda som går och springer mer än den hoppar. Den är mest aktiv på kvällen och natten och gömmer sig på dagen. Hotad pumpar den upp sig och visar de röda banden.
NATURLIG UTBREDNING	Kongo-Kinshasa, Etiopien, Somalia, Kenya, Tanzania, Moçambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Namibia, Angola, Sydafrika och Eswatini.