herpy

GRODOR

Giant Monkey Frog

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa bicolor är en av världens största trädgrodor: en lugn, vaxbelagd klättrare från Amazonas som går långsamt på grenar i stället för att hoppa. Den är nattaktiv, lever av insekter och kräver ett högt, luftigt terrarium med måttlig fuktighet, inte den blöta regnskogsluft som de flesta andra trädgrodor får.

Familj: Phyllomedusidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-12 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Ägg per läggning	**600**
Kläckning	**7-14 dagar** vid 24 °C
Larvtid	**80-100 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-4 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Grodan använder höjden och ska ha ett högt, väl ventilerat terrarium. För två vuxna djur, en hane och en hona, är 45 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd) minimum, och högre är bättre.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 22-27 °C i terrariet, och omkring 24 °C är idealiskt. På natten får temperaturen sjunka till 18-22 °C, och ett fall på några grader är bra.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara måttlig och inte tropiskt blöt. Vuxna djur trivs vid 50-60 %, och 40-70 % tolereras. Under 40 % finns risk för uttorkning, och över 70 % under längre tid kan ge luftvägsinfektioner.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ fram en stor, men låg vattenskål på botten så att grodan kan lägga sig och ta upp vatten. Vattendjupet ska vara 2-4 cm och aldrig så djupt att en liten groda inte kan sitta med huvud och överkropp ovanför vattnet.
LJUS OCH UVB	Växterna och dygnsrytmen är det viktigaste. Använd en LED-lampa eller ett rör som lämpar sig för växter, 12 timmar om dagen och mörker på natten.
UTFODRING	Grodan är en nattaktiv jägare som ligger på lur och tar levande insekter som rör sig. Vuxna djur får syrsor i lämplig storlek (3-5 veckor gamla), dubia-kackerlackor, silkesmaskar, hornmaskar och vaxmalslarver.
BETEENDE OCH HANTERING	*P. bicolor* är en lugn groda som kan sitta stilla i timmar, och den blir sällan stressad av dagsljus.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien, Colombia, Bolivia, Peru, Venezuela, Guyana, Surinam och Franska Guyana.