herpy

GRODOR

Waxy Monkey Tree Frog

Phyllomedusa sauvagii

Phyllomedusa sauvagii är en stor, lugn lövgroda från Gran Chaco och de angränsande skogarna i Sydamerika. Den stryker själv ut ett vattentätt, vaxartat lager över huden och kräver därför ett varmare och torrare terrarium än de flesta andra lövgrodor. Hudsekretet är biologiskt aktivt, så tvätta händerna efter kontakt.

Familj: Phyllomedusidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**50-75 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**18 °C** 4-6 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**200-800**
Kläckning	**5-9 dagar**
Larvtid	**28-42 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	*Phyllomedusa sauvagii* är trädlevande och behöver höjd och många grenar. För två djur räcker 45 × 45 × 60 cm. En grupp på 3-4 djur behöver minst 45 × 45 × 90 cm, och 5-8 djur minst 90 × 45 × 90 cm.
TEMPERATUR	Håll 24-29 °C på dagen med en värmeplats på 29-32 °C högst upp och ett fall till 18-21 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 50-60 % på dagen och stiga till 70-75 % morgon och kväll, när terrariet är sprayat. Det är torrt för en lövgroda och en viktig skillnad mot t.ex. *Agalychnis callidryas*.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ställ in en stabil vattenskål med släta stenar eller en sluttande kant, så att grodan lätt kommer upp, och byt vattnet varje dag. Grodan tar upp vatten genom huden och sitter gärna i skålen.
LJUS OCH UVB	Ge 12 timmars ljus per dag och mörker på natten, och använd växtljus om terrariet är planterat.
UTFODRING	*Phyllomedusa sauvagii* äter insekter: syrsor, kackerlackor, mott, flugor och vaxmottslarver. Foderdjuret får högst vara lika brett som grodans huvud. Många grodor avvisar maskliknande föda.
BETEENDE OCH HANTERING	*Phyllomedusa sauvagii* är lugn och långsam och går i stället för att hoppa. Den är aktiv i skymningen och på natten, men vänjer sig vid att bli aktiv när foderdjur kommer in i terrariet.
NATURLIG UTBREDNING	Argentina, Bolivia, Paraguay och Brasilien.