herpy

GRODOR

White-lined Leaf Frog

Phyllomedusa vaillantii

Phyllomedusa vaillantii är en nattaktiv bladgroda från Amazonas, 5-8 cm lång, med grön rygg, rödbruna flanker och röda, lavendelfärgade eller orangea färger på lårens insida. Den går långsamt över grenar i stället för att hoppa och lägger sina ägg i ett vikt bladbo över vatten.

Familj: Phyllomedusidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-8 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**200-800**
Kläckning	**5-14 dagar** vid 24 °C
Larvtid	**40-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett högt, välventilerat terrarium passar bäst, eftersom grodan är ett trädlevande djur. Två vuxna djur behöver minst 45 × 45 × 90 cm (längd × bredd × höjd), och en liten grupp behöver mer golvyta.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen hålls på 24-28 °C. På natten får den gärna falla 3-6 grader, till 20-24 °C, som i naturen. Någon hotspot-lampa behövs inte om rummet är varmt nog.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga mellan 60 och 80 % med naturliga svängningar under dagen. Spruta terrariet en eller två gånger dagligen, helst på kvällen, så att det kan torka upp lite under dagen.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Grodan sitter gärna i en vattenskål på natten, och skålen ska därför vara tillräckligt stor för att djuret ska kunna sitta i vattnet, och tillräckligt låg för att det aldrig riskerar att drunkna: 2-5 cm djup med en sten eller en gren som utgång.

LJUS OCH UVB

Ge 10-12 timmars ljus om dagen på en timer, och släck ljuset på natten. Belysning för växterna räcker, och grodan sover under bladen på dagen, så det måste alltid finnas skugga. UVB behövs inte, men ett lågeffekts UVB-rör, t.ex.

UTFODRING

Grodan äter levande insekter som fångas på natten: syrsor, flugor, kackerlackor och vaxmott. Vuxna djur får 2-8 foderdjur per groda, ungefär varannan till var femte dag. Foderdjuren ska vara mindre än avståndet mellan grodans ögon.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är lugn och nattlig, och den sover hela dagen på ett blad med benen indragna. På natten blir den aktiv om den inte störs. Hanarna ropar på natten, särskilt efter sprutning.

NATURLIG UTBREDNING

Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam och Venezuela.