herpy

GRODOR

Four-lined Tree Frog

Polypedates leucomystax

Polypedates leucomystax är en smal, nattaktiv trädgroda på 4-9 cm från Sydostasien, som lägger äggen i ett skumbo vid vattnet. Den är anpassningsbar, lever gärna nära människor och är lätt att hålla, men tål inte värme över 29 °C. Förökningen sätts igång i en regnkammare.

Familj: Rhacophoridae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-9 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog, regnskog och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Ägglägging	**I ett skumbo**
Ägg per läggning	**100-400**
Kläckning	**3-4 dagar**
Larvtid	**49-70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Två vuxna *Polypedates leucomystax* behöver ett glasterrarium på minst 45 × 45 × 60 cm, och det räcker för upp till fyra djur. Arten hoppar långt och har nytta av mer plats.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 23-27 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Den övre gränsen är viktig: över 29 °C kan snabbt bli dödligt, särskilt om grodan samtidigt saknar vatten eller fukt. En svag värmelampa räcker om rummet är svalt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Håll luftfuktigheten på 60-70 %. Det klaras med handspruta, dimanläggning eller regnanläggning, flera gånger om dagen efter behov.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

P. leucomystax ska alltid ha tillgång till rent vatten i en stor, låg skål som är lätt att göra ren och som grodan lätt kan ta sig upp ur.

LJUS OCH UVB

Arten behöver inget annat ljus än det som växterna kräver. Det finns ingen dokumentation för att den behöver UVB, men en svag UVB-källa kan användas för växterna och verkar dessutom bakteriehämmande.

UTFODRING

P. leucomystax är insektsätare, och syrsor kan vara basfoder, kompletterat flera gånger i månaden med vaxmottslarver, silkesmaskar, nattfjärilar, flugor, små daggmaskar och små kackerlackor.

BETEENDE OCH HANTERING

P. leucomystax är nattaktiv och sitter på dagen gömd bland växter och grenar, men nappar gärna åt sig ett foderdjur som kommer förbi. Den hoppar långt och klättrar bra, men glidflyger inte som en del av släktingarna i familjen.

NATURLIG UTBREDNING

Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand.