herpy

GRODOR

## Edible Bullfrog

# *Pyxicephalus edulis*

*Pyxicephalus edulis* är en kraftig, bredmunnad grävande groda från Afrikas savanner och översvämmade gräsmarker: mindre än *Pyxicephalus adspersus*, men med samma aptit, samma tandliknande utskott på käken och ett bett som ska tas på allvar. Den tillbringar största delen av tiden nedgrävd, är robust och kan hållas i ett relativt litet terrarium.

Familj: Pyxicephalidae

FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **8-12 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Marklevande och grävande** |
| Biotop | **Savann och våtmark** |
| Hudgift | **Inget känt** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 45 × 30 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **23-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **50-70 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodyngel i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Ägg per läggning | **3 000-4 000** |
| Kläckning | **2-3 dagar**<br>vid 24-27 °C |
| Larvtid | **14-35 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Pyxicephalus edulis*, och det mesta som skrivs om tjurgrodor handlar om den större *Pyxicephalus adspersus*. |
| **TEMPERATUR** | På dagen ska terrariet hålla 23-26 °C och på natten 18-22 °C. Temperaturen ska ligga jämnt och får inte gå över 28 °C någon längre tid: redan vid en ökning från 25 till 30 °C stiger stresshormonerna, och djuren tappar vikt. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska vara 50-70 %. Den kommer från den fuktiga botten och vattenkaret, och terrariet dimmas dagligen med vatten utan klor, så att botten håller sig lätt fuktig. En digital hygrometer visar om nivån håller. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | Grodan ska alltid ha tillgång till ett stort, platt kar där hela djuret kan ligga och bada. |
| **LJUS OCH UVB** | Arten är mest aktiv i skymningen och på natten och behöver inte starkt ljus. |
| **UTFODRING** | *Pyxicephalus edulis* är ett rovdjur som äter nästan allt den kan övermanna. I naturen består födan särskilt av skalbaggar och gräshoppor, dessutom termiter, tusenfotingar, myror och spindlar. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | Djuret ligger nästan alltid nedgrävt med bara ögon och näsborrar ovanför botten och väntar på byte. Det är mest aktivt i skymningen och på natten och kommer fram för att jaga och simma. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Benin, Nigeria, Tchad, Kamerun, Angola, Zambia, Kenya, Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Botswana och Sydafrika. |